



# Tabakabhängigkeit: Fälle pro 1.000 berufstätige KKH-Mitglieder im Jahresvergleich



Basis: rund 675.300 KKH-Mitglieder mit Krankengeldanspruch. Ausgewertet wurde die Diagnose F17 nach ICD-10 (ambulant). 2022 waren bundesweit rund 54.600 Mitglieder betroffen.




# Tabakabhängigkeit bei Berufstätigen: Prozentualer Anstieg im Bundesländervergleich von 2012 auf 2022



Basis: rund 675.300 KKH-Mitglieder mit Krankengeldanspruch. Ausgewertet wurde die Diagnose F17 nach ICD-10 (ambulant). 2022 waren bundesweit rund 54.600 Mitglieder betroffen.


**KKH**

# Tabakabhängigkeit bei Berufstätigen: Prozentualer Anstieg im Bundesländervergleich von 2019 auf 2022



Basis: rund 675.300 KKH-Mitglieder mit Krankengeldanspruch.  
Ausgewertet wurde die Diagnose F17 nach ICD-10 (ambulant). 2022 waren bundesweit rund 54.600 Mitglieder betroffen.

# Tabakabhängigkeit bei Berufstätigen: Durchschnittliche Krankschreibedauer pro Fall in Tagen



Basis: rund 675.000 KKH-Mitglieder mit Krankengeldanspruch. Ausgewertet wurde die Diagnose F17 nach ICD-10 (ambulant). 2022 waren bundesweit rund 54.600 Mitglieder betroffen.

**KKH**